


pLV-CAG-mcherry-N

Cat. No. VL3223

慢病毒基因过表达载体

Created with SnapGene®



Multiple Cloning Site

										<u>EcoRI</u>	<u>MluI</u>	<u>NotI</u>				
TTA	TTG	TGC	TGA	CGC	GCT	AGA	AAT	GTA	CAA	GGA	ATT	CAC	GCG	TGC	GGC	CGC
<u>XhoI</u>		<u>SmaI</u>			<u>BamHI</u>		<u>Start of mcherry</u>									
CTC	GAG	TTC	GAA	CCC	GGG	CCC	GGA	TCC	ATG	GTG	AGC					

MCS 及其上下游序列:

```

GCGGGGTTTCGGCTTCTGGCGTGTGACCGGCGGCTCTAGAGCCTCTGCTAACCATGTTTCATGCCTT
CTTCTTTTTCCTACAGCTCCTGGGCAACGTGCTGGTTATTGTGCTGACGCGCTAGAAATGTACAA
EcoRI MluI NotI XhoI SmaI BamHI Start of mcherry
GGAATTCACGCGTGCGGCCGCTCGAGTTCGAACCCGGGCCCGGATCCATGGTGAGCAAGGGCGA
GGAGGATAACATGGCCATCATCAAGGAGTTCATGCGCTTCAAGGTGCACATGGAGGG
    
```

载体特性:

类型: 慢病毒基因过表达载体

基因启动子: CAG promoter

荧光标签: mcherry

真核细胞筛选抗性: Puromycin

原核抗性: Ampicillin

pLV-CAG- mcherry -N 载体是基于 HIV1 的慢病毒基因过表达载体。该载体的多克隆位点位于 mcherry 基因上游, 在 CAG 启动子驱动下表达目的基因和 mcherry 融合蛋白。CAG 启动子人工构建的组合启动子, 由巨细胞病毒 (the cytomegalovirus, CMV) 早期增强子 (early enhancer element) 和鸡 β -肌动蛋白 (chicken beta-actin) 启动子组成, 用于驱动基因在哺乳动物载体的高水平表达。PGK 启动子驱动表达 Puromycin 抗性基因。利用本载体包装的慢病毒将表达 Puromycin 抗性基因, 可以方便地使用 Puromycin 筛选出稳定过表达目的基因的细胞。同时表达带有 mcherry 荧光标签的目的基因, 可以很容易的对病毒感染效率以及目的基因的表达和定位进行监测。

pLV-CAG- mcherry -N 载体包含了生产慢病毒所必须的病毒原件以及提高病毒滴度及基因表达效率的原件。载体结构紧凑, 在保证产生高滴度病毒的同时, 载体对外源基因片段的容量达到 3kb, 多数哺乳动物基因都可以在 pLV-CAG- mcherry -N 中成功表达。

用法说明

pLV-CAG- mcherry -N 载体用于在包括原代培养细胞在内的各种哺乳动物细胞中稳定表达外源基因和 Puromycin 抗性基因。pLV-CAG- mcherry -N 载体与包装载体共转染 HEK293T 细胞后 (包装体系货号 KLV3501 和 KLV3502), 产生高滴度复制缺陷的慢病毒颗粒, 可以直接用于感染细胞或者纯化浓缩后感染细胞。

正向测序引物: pCAGGS-5: GGTTTCGGCTTCTGGCGTGTGACC

反向测序引物: mcherry -N-3: CCCTCCATGTGCACCTTGA

主要载体元件位置

- 5' LTR: 1-634
- Psi (packaging signal): 681-806
- RRE: 1303-1536
- cPPT/CTS: 2028-2144
- CAG promoter: 2185-3851
- MCS (multiple cloning site): 3902-3948
- mcherry: 3949-4659
- PGK promoter: 4680-5179
- Puromycin resistance gene: 5200-5799
- WPRE: 5813-6401
- 3' LTR: 6608-7241
- pUC origin: 7771-8359 (complementary)
- Ampr(R): 8530-9390 (complementary)

原核培养特性

pLV-CAG- mcherry -N 载体为高拷贝质粒, 带有氨苄抗性基因, 可以在含有 100 μ g/ml 氨苄抗生素的 LB 培养基中增殖。宿主菌可以采用 DH5 α , JM109, TOP10 等常见大肠杆菌菌种。

注意: 本载体中的部分序列来自自己公布数据库, 本公司没有对该载体完全测序。